

大腸がん

更新日: 2024/11/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
3	FOLFIRI	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
32	アバスタチン+mFOLFOX6	アバスタチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
33	アバスタチン5+FOLFIRI	アバスタチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
58	アバスタチン5+sLV5FU2	アバスタチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
59	アービタックス単独(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	7
60	アービタックス単独(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1	7
61	アービタックス+イリノテカン(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
62	アービタックス+イリノテカン(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
65	レボホリナート+5FU	レボホリナート	点滴	250mg/m ²	d1,8,15,22,29,36	56
		フルオロウラシル	点滴	600mg/m ²	d1,8,15,22,29,36	
88	イリノテカン単独150(2週)	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
92	アービタックス+FOLFIRI(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
93	アービタックス+FOLFIRI(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
100	CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
101	アバスタチン7.5+CapeOX	アバスタチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
102	アバスタチン7.5+カペシタビン	アバスタチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
116	IRIS (イリノテカン+S1)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,15	28
		S1	経口	80mg/m ²	d1夕-d15朝	
117	アバステン+IRIS (イリノテカン+S1)	アバステン	点滴	5mg/kg	d1,15	28
		イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,15	
		S-1	経口	80mg/m ²	d1夕-d15朝	
131	ベクティビックス単独	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
132	ベクティビックス+FOLFIRI (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
133	ベクティビックス+FOLFIRI (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
134	ベクティビックス+mFOLFOX6 (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
135	ベクティビックス+mFOLFOX6 (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
136	ベクティビックス+sLV5FU2 (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
137	ベクティビックス+sLV5FU2 (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
138	ベクティビックス+イリノテカン150 (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
139	ベクティビックス+イリノテカン150 (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
147	血管痛対策CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カペシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
148	血管痛対策アバステン+CapeOX	アバステン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
163	sLV5FU2	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	14
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
164	アバステン+FOLFIRI	アバステン	点滴	10mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
198	CapeIRI	イリノテカン	点滴	200mg/m ²	d1	21
		カペシタピン	経口	1600mg/m ² /日	d1夕-d15朝	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
199	アバステン+CapelIRI	アバステン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		イリノテカン	点滴	200mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	1600mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
210	SOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
211	アバステン+SOX	アバステン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
212	アバステン+S1	アバステン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
232	アービタックス+mFOLFOX6(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
233	アービタックス+mFOLFOX6(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
247	血管痛対策SOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
248	血管痛対策アバステン+SOX	アバステン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
308	サイラムザ+FOLFIRI	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
315	アバステン+UFT+ホリナート	アバステン	点滴	5mg/kg	d1,15	28
		ユージェフティ	内服	300mg/m ² /日	d1タ-d22昼	
		ホリナート	内服	75mg/body/日	d1タ-d22昼	
318	ザルトラップ+FOLFIRI	ザルトラップ	点滴	4mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
323	ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
324	ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
325	アバステン+FOLFOXIRI	アバステン	点滴	5mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
326	アバスタチン+ロンサーフ	アバスタチン	点滴	5mg/kg	d1,15	28
		ロンサーフ	内服	70mg/m ² /日	d1タ-d6朝 d8タ-d13朝	
328	FOLFOXIRI	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
329	アービタックス+FOLFOXIRI(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
330	アービタックス+FOLFOXIRI(2回目以降)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1,8	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
332	アバスタチン10+S1	アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15	28
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
335	アービタックス+S1(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	42
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8,15,22,29,36	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d29朝	
336	アービタックス+S1(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8,15,22,29,36	42
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d29朝	
343	アービタックス+SOX(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	21
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8,15	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
344	アービタックス+SOX(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8,15	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
345	血管痛対策アービタックス+SOX(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	21
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8,15	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
346	血管痛対策アービタックス+SOX(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8,15	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
371	SIRB(アバスタチン+イリノテカン+S1)	アバスタチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
397	biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(初回)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
398	biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(2回目以降)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
399	biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(初回)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
400	biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(2回目以降)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
404	アービタックス+IRIS(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	21
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8,15	
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1ター-d15朝	
405	アービタックス+IRIS(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8,15	21
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1ター-d15朝	
430	アービタックス+ビラフトビ(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
431	アービタックス+ビラフトビ(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
432	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
		メクトビ	内服	90mg/日	連日	
433	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
		メクトビ	内服	90mg/日	連日	
437	パージェダ840+ハーセプチン(初回)	パージェタ	点滴	840mg	d1	21
		ハーセプチン	点滴	8mg/kg	d1	
438	パージェダ420+ハーセプチン(2回目以降)	パージェタ	点滴	420mg	d1	21
		ハーセプチン	点滴	6mg/kg	d1	
472	ペバシズマブ+ロンサーフ(PRABITAS)	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	14
		ロンサーフ	内服	70mg/m ² /日	d1ター-d6朝	

MSI-highを有する大腸がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21
353	オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	240mg	d1	21
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
390	オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28