

尿路上皮がん

更新日: 2024/11/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
18	ピノルビン膀胱注	ピノルビン	膀胱注入	30mg	d1	7
48	ゲムシタピン単独(4週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	d1,8,15	28
96	M-VAC	メトレキセート	点滴	30mg/m ²	d1,15,22	28
		エクザール	点滴	3mg/m ²	d2,15,22	
		ドキシソルピシシ	点滴	30mg/m ²	d2	
		シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d2	
140	GC (ゲムシタピン+シスプラチン70)(3週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	d1,8	21
		シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d2	
153	カルボプラチンAUC4.5+ゲムシタピン	カルボプラチン	点滴	AUC4.5	d1	21
		ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	d1,8	
228	シスプラチン+ドキシソルピシシ動注	シスプラチン	動注	70mg/m ²	d1	21
		ドキシソルピシシ	動注	30mg/m ²	d1	
297	ddMVAC	メトレキセート	点滴	30mg/m ²	d1	14
		エクザール	点滴	3mg/m ²	d2	
		ドキシソルピシシ	点滴	30mg/m ²	d2	
		シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d2	
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
299	オブジーボ単剤(過敏症対策あり)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
389	オブジーボ単剤【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
390	オブジーボ単剤(過敏症対策あり)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
409	パベンチオ単独	パベンチオ	点滴	10mg/m ²	d1	14
418	パドセブ	パドセブ	点滴	1.25mg/kg	d1,8,15	28

前立腺がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
78	ドセタキセル70(3週)	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	d1	21
257	ジェブタナ単独	ジェブタナ	点滴	25mg/m ²	d1	21
488	DTX+ニューベクオ+ADT	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	21
		ニューベクオ	経口	1200mg/日	連日	

腎細胞がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
162	トーリセル	トーリセル	点滴	25mg	d1	7
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
353	オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	240mg	d1	21
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
381	キイトルーダ+インライタ	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		インライタ	内服	1日2回1回5mg	連日	
387	バベンチオ+インライタ	バベンチオ	点滴	10mg/kg	d1	14
		インライタ	内服	1日2回1回5mg	連日	
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
390	オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
427	オブジーボ+カボメテイクス	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
		カボメテイクス	内服	40mg/日	連日	
434	キイトルーダ+レンビマ	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		レンビマ	内服	20mg/日	連日	

副腎皮質がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
91	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル70	パクリタキセル	点滴	70mg/m ²	d1,8,15	28
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	
123	EDP(エトポシド+ドキシソルピシン+シスプラチン)+オベプリム	シスプラチン	点滴	40mg/m ²	d1,9	28
		ドキシソルピシン	点滴	20mg/m ²	d1,8	
		エトポシド	点滴	100mg/m ²	d5,6,7	
		オベプリム	経口	4g/日	連日	

尿管がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
363	FP療法(尿管癌)[患者限定]	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
391	mFOLFOX6(尿管癌)[患者限定]	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
420	アバステン5+FOLFIRI(尿管癌)[患者限定]	アバステン	点滴	5mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
441	パクリタキセル175+カルボプラチン(AUC5)[患者限定]	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	