

悪性神経膠腫

更新日: 2024/11/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
178	テモダール75点滴(初期治療)	テモダール	点滴	75mg/m ²	d1-42	70
179	テモダール150点滴(維持療法)	テモダール	点滴	150mg/m ² (2クール目以降 200mg/m ² まで 増量可)	d1-5	28
200	アバスタチン単独10	アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1	14
231	アバスタチン単独15	アバスタチン	点滴	15mg/kg	d1	21
242	アバスタチン+テモゾロミド内服(維持療法)	アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15	28
		テモゾロミド	経口	150mg/m ² /日 (2クール目以降 200mg/m ² まで 増量可)	d1-5	
243	アバスタチン+テモゾロミド内服(初期治療)	アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15,29,42	70
		テモゾロミド	経口	75mg/m ² /日	d1-42	
278	アバスタチン+テモダール150点滴(維持療法)	テモダール	点滴	150mg/m ²	d1-5	28
		アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15	
334	アバスタチン+テモゾロミド内服(維持療法)	アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15	28
		テモゾロミド	内服	150mg/m ² /日 (2クール目以降 200mg/m ² まで 増量可)	d1-5	
365	アバスタチン+テモダール75点滴(初期治療)	テモダール	点滴	75mg/m ²	d1-42	70
		アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15,29,42	
366	アバスタチン+テモダール200点滴(維持療法)	テモダール	点滴	200mg/m ²	d1-5	28
		アバスタチン	点滴	10mg/kg	d1,15	

頭蓋内原発悪性リンパ腫

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
254	DeVIC(カルボプラチン+イホマイド+エトポシド+デキサート)	デキサート	点滴	16.5mg 1日2回	d1-3	28
		カルボプラチン	点滴	300mg/m ²	d1	
		エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-3	
		イホマイド	点滴	1.5g/m ²	d1-3	

嗅神経芽細胞腫

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
167	シスプラチン80+エトポシド	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-3	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	

その他

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
166	ICE(カルボプラチン+イホマイド+エトポシド)	カルボプラチン	点滴	300mg/m ²	d1	28
		エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-3	
		イホマイド	点滴	1.5g/m ²	d1-3	
214	小児ICE(カルボプラチン+イホマイド+エトポシド)	カルボプラチン	点滴	300mg/m ²	d1	28
		エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-3	
		イホマイド	点滴	1500mg/m ²	d1-3	